

Dispositifs transdermiques (patches) à base de rivastigmine

CARNET PATIENT

➔ Instructions d'utilisation et de suivi du traitement

Quels médicaments sont concernés par cette information ?

Les dispositifs transdermiques contenant de la RIVASTIGMINE.

Le nom du médicament délivré par votre pharmacien peut être différent de celui prescrit par votre médecin.

Soyez vigilant en cas de changement : l'aspect du patch peut changer d'une marque à l'autre.

Ce document est diffusé par les laboratoires commercialisant des médicaments génériques sous forme de dispositif transdermique à base de Rivastigmine, sous l'autorité de l'ANSM.

Instructions d'utilisation

Ce qu'il est important de se rappeler

- Retirez le dispositif transdermique précédent avant d'appliquer **un** nouveau dispositif.
- **Un** seul dispositif transdermique par jour.
- Ne découpez pas le dispositif transdermique en morceaux.
- Appuyez fermement sur le dispositif transdermique avec la paume de la main pendant au moins 30 secondes une fois appliqué sur la peau.

- ➔ Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations, veuillez lire la notice d'information accompagnant le médicament.
- ➔ Si vous avez des doutes, veuillez demander à votre médecin ou votre pharmacien.
- ➔ Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Comment appliquer le dispositif transdermique ?

- 1 Retirez avec précaution le dispositif transdermique précédent avant d'appliquer **un** nouveau dispositif.
- 2 Sortez le nouveau dispositif du sachet.
- 3 Décollez un côté de la pellicule protectrice du dispositif transdermique.
- 4 Collez le dispositif transdermique sur le haut ou le bas du dos, le haut du bras ou la poitrine et décollez le second côté de la pellicule protectrice.
- 5 Appuyez fermement sur le dispositif transdermique pendant au moins 30 secondes pour que les bords adhèrent bien.




Où appliquer le dispositif transdermique ?

Retirez le dispositif transdermique précédent avant d'appliquer **un** nouveau dispositif.

Appliquez **un** nouveau dispositif transdermique par jour sur **une** des zones suivantes.

Vous pouvez utiliser la même zone (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais n'utilisez pas exactement le même endroit.



Fiche de suivi du traitement

Comment utiliser cette fiche de suivi ?

- Utilisez cette fiche de suivi pour noter le moment où vous appliquez et retirez le dispositif transdermique.
- Cochez la case lorsque vous avez retiré l'ancien dispositif transdermique.
- Indiquez la date et le jour d'application du nouveau dispositif transdermique.
- Indiquez la lettre correspondante à la zone d'application où vous avez appliqué le nouveau dispositif transdermique.
- Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations, veuillez lire la notice d'information accompagnant le médicament.
- Si vous avez des doutes, veuillez demander à votre médecin ou votre pharmacien.

Comment remplir cette fiche de suivi ?

Ancien dispositif transdermique retiré ?	Date d'application du nouveau dispositif transdermique	Jour d'application du nouveau dispositif transdermique	Zone d'application du nouveau dispositif transdermique (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Novembre 2014	Dimanche	A

Zones d'application

Appliquez **un** nouveau dispositif transdermique par jour sur **une** des zones suivantes.

Vous pouvez utiliser la même zone (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais n'utilisez pas exactement le même endroit.

